

FOR CONTROL OF MODERATE-TO-SEVERE-PAIN

INITIAL DOSE:

YOU MAY TAKE 400-600 MGS OF IBUPROFEN (2-3 TABLETS) ALONG WITH 500-750 MGS OF ACETAMINOPHEN (1 EXTRA STRENGTH OR 2 REGULAR STRENGTH TABLETS) EVERY 6 HOURS FOR THE NEXT 24 HOURS.

ADDITIONAL DOSE (AFTER 24 HOURS):

YOU MAY THEN TAKE 400 MGS IBUPROFEN WITH 500 MGS ACETAMINOPHEN EVERY 6 HOURS IF NEEDED.

* DO NOT TAKE MORE THAN 3,000 MGS OF ACETAMINOPHEN PER DAY (9 REGULAR STRENGTH OR 6 EXTRA STRENGTH TABLETS)

ACETAMINOPHEN CAN CAUSE LIVER DAMAGE IF NOT TAKEN CORRECTLY.

* IF PAIN PERSISTS FOR MORE THAN 4 DAYS CONTACT YOUR DENTIST.

* THESE INSTRUCTIONS ARE BASED OFF OF YOUR NOT TAKING ANY MEDICATIONS AT ALL AND MAY VARY IF OTHER MEDICATIONS ARE BEING TAKEN..

* THESE RECOMMENDATIONS ARE FOR ADULTS.

PARA EL CONTROL DE DOLOR MODERADO A SEVERO

DOSIS INICIAL:

PUEDE TOMAR DE 400-600 MGS DE IBUPROFENO (2-3 TABLETAS) JUNTO CON 500-750 MGS DE ACETAMINOFEN (1 TABLETA DE CONCENTRACION EXTRA O 2 DE CONCENTRACION REGULAR) CADA 6 HORAS DURANTE LAS PROXIMAS 24 HORAS

DOSIS ADICIONAL (DESPUES DE 24 HORAS):

USTED PUEDE TOMAR 400 MGS DE IBUPROFENO CON 500 MGS DE ACETAMINOFEN CADA 6 HORAS SI ES NECESARIO.

* NO TOME MAS DE 3, 000 MGS DE ACETAMINOFEN POR DIA (9 TABLETAS DE CONCENTRACION REGULAR O 6 TABLETAS DE CONCENTRACION EXTRA). EL ACETAMINOFÉN PUEDE CAUSAR DAÑO AL HÍGADO SI NO SE TOMA CORRECTAMENTE.

*SI EL DOLOR PERSISTE POR MAS DE 4 DIAS COMUNIQUESE CON SU DENTISTA

* ESTAS INSTRUCCIONES ESTÁN BASADAS EN QUE USTED NO ESTÁ TOMANDO NINGÚN MEDICAMENTO EN ABSOLUTO Y PUEDEN VARIAR SI ESTÁ TOMANDO OTROS MEDICAMENTOS.

*ESTAS RECOMENDACIONES SON PARA ADULTOS.